

Alim Brusse

Vass7R01s351-355



Collection Vassal-Montpellier

OMtp17


*7 R 1 s 351-355
Alim Brusse*

Alim Brusse

7 R 1 s 351-355

faible





ANNEE: 1995

NCM *Alvin Brusse*

EMPLACEMENT 7 R1 A 351.355

[illegible]

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Alim brusse
7R 1 A-351-355a.1

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - sétueux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 -
cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité
laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 -
jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé
ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Étalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - sétueuses 200 - veloutées 201 -
aranéuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité
pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 -
à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 -
entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - sétueux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 -
duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 -
sans villosité laineuse 283.

Limbe : glabre 220 - sétueux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 -
duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 -
sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 -
jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou
cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - sétueux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 -
duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans
villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 91

N° d'ordre :
Désignation :
Emplacement :

Alim busse

7 R 10-351.355A.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 -
sèteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241.
sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.
Entièrement - partiellement.

Méridithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256.

ventre coloré 257 ^{test} - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 ^{base} - rouge foncé 263.
subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265.

(I) FLEUR

♀

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 94

Formulaire de description 4/8
(entre nouaison et véraison)

Année : 1998

Observateur : Lacombe

Code cépage :

Code clone :

Nom cépage : Alimousse

Emplacement : FRS 351-355

(maubée!)

Feuille adulte

oiv 065 **taille** : très petite 1 - petite 3 - moyenne 5 - grande 7 - très grande 9.

oiv 067 **forme du limbe** : cordiforme 1 - cunéiforme 2 - pentagonale 3 - orbiculaire 4 - réniforme 5

oiv 068 **nombre de lobes** : feuille entière 1 - trois 2 - cinq 3 - sept 4 - plus de sept 5.

oiv 069 **couleur face supérieure limbe** : vert clair 3 - vert moyen 5 - vert foncé 7.

oiv 070 **pigmentation anthocyanique nervures face supérieure limbe** : nulle 1 - point pétiole rouge 2 - rouge jusqu'à première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 071 **pigm. antho. nerv. face inf. limbe** : nulle 1 - point pétiole rouge 2 - rouge jusqu'à première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 072 **gaufre limbe** (entre nervures II et III) : absente 1 - présente 9.

oiv 073 **ondulation limbe** (entre nervures I et II) : absente 1 - présente 9.

oiv 074 **profil** : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

oiv 075 **cloque face supérieure limbe** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 084 **densité poils couchés entre nervures face inférieure** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 085 **densité poils dressés entre nervures face inférieure** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 086 **densité poils couchés des nervures face inférieure** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 087 **densité poils dressés des nervures face inférieure** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 087* **densité poils dressés face inférieure** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 088 **villosité couchée des nervures principales face supérieure** : absente 1 - présente 9.

oiv 089 **villosité dressée des nervures principales face supérieure** : absente 1 - présente 9.

Pétiole

oiv 090 **densité poils couchés** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 091 **densité poils dressés** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 093 **longueur du pétiole p/r nervure médiane** : beaucoup plus court 1 - plus court 3 - égal 5 - plus long 7 - beaucoup plus long 9.

Vassal :

Densité poils couchés limbe face supérieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Densité poils dressés limbe face supérieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Couleur du pétiole : vert 178 - partiellement coloré 177 - coloré 176.


Formulaire description 5 / 8 (maturité physiologique)		Emplacement <i>FR1 351-355</i>
Nom variété / introduction <i>Alim Brusse</i>		Remarques <i>très charge (PdG 2009)</i> <i>en taille courte</i>
Observateur - Date <i>CM+R 17/8/17</i>	Code var / intro <i>OMkp17</i>	

GRAPPE						
Code OIV	Descripteur	1	3	5	7	9
202 = (32)	Longueur sans pédoncule Valeur absolue (en cm) : <i>16</i>	très courte (<10 cm)	courte (10-14 cm)	<u>moyenne</u> (14-18 cm)	longue (18-25 cm)	très longue (>25 cm)
203 = (32)	Largeur Valeur absolue (en cm) : <i>12</i>	très étroite (<5 cm)	étroite (5-10 cm)	<u>moyenne</u> (10-15 cm)	large (15-20 cm)	très large (>20 cm)
204 = 33	Compacité	très lâche	lâche	moyenne	<u>compacte</u>	très compacte
000-46	Millerandage	nul ou t. fb.	<u>faible</u>	moyen	fort	très fort
206 = 34	Longueur du pédoncule Valeur absolue (en cm) : <i>2</i>	très court (<3 cm)	<u>court</u> (3-5 cm)	moyen (5-7 cm)	long (7-10 cm)	très long (>10 cm)
207	Lignification du pédoncule	<u>base seule.</u>		jusqu.moitié	+ de moitié	
000-11	Couleur de l'axe de la rafle	1-coloré	<u>2-non color</u>	<i>pédoncule 1 peu large</i>		
208	Forme de la grappe	1.cylindrique	<u>2-conique</u>	3-entonnoir		
209	Nombre d'ailes de la grappe principale	1-absentes	<u>2- Une à deux ailes</u>	3- trois à quatre ailes	4- cinq à six ailes	5- plus de six ailes

BAIE												
220 = (35)	Longueur Valeur absolue (en mm) : <u>19</u>				très courte (<u><8mm</u>)	courte (8-14mm)	moyenne (<u>14-20mm</u>)	longue (20-26mm)	très longue (<u>>26mm</u>)			
221 = (35)	Largeur Valeur absolue (en mm) : <u>18</u>				très étroite (<u><8mm</u>)	étroite (8-14mm)	moyenne (<u>14-20mm</u>)	large (20-26mm)	très large (<u>>26mm</u>)			
222	Uniformité de la grosseur				1-non unif.	3-uniforme						
223 = 36	Forme	1- sphérique aplatie	2- sphérique	3- elliptique courte	4- elliptique longue	5- cylindrique	6- tronconique	7- ovoïde	8- obovoïde	9- arquée	10- fusiforme	
225 = 37	Couleur épiderme + ocvv		1- vert jaune	2- rose	3- rouge	4- gris	5- rouge foncé violet			6- bleu noir		
<u>vert</u>			jaune	jaune-rosé								
226	Uniformité couleur épiderme			1- non uniforme		3- uniforme						
227	Pruine			nul ou t. fb.		faible		moyenne	<u>forte</u>	très forte		
228 = 39	Epaisseur pellicule			très mince		mince		moyenne	<u>épaisse</u>	très épaisse		
229	Ombilic (apparence)			1- peu apparent		<u>2- apparent</u>						
000-18	Région ombilicale (dépression)			1- déprimée		<u>2- non déprimée</u>						
230	Coloration de la pulpe			<u>1-non colorée</u>		2- colorée						
231 = 40	Intensité pigmentation anthocian. pulpe			<u>nul ou t. fb.</u>		faible						
232	Succulence de la pulpe			1- peu juteuse		<u>2- moyen. juteuse</u>		3- très jut.				
233	Rendement en jus (ml / 100g baies)					faible		moyen	élevé			
235 = 41	Fermeté de la pulpe			1- molle		<u>2- légèrem. ferme</u>		3-très ferme				
236 = 42	Saveur			<u>1-aucune</u>		2- muscatée		3- foxée	4- herbacée	5-autre		
238	Longueur pédicelle			très court (<u><4mm</u>)		<u>court</u> (4-8mm)		moyen (8-12mm)	long (12-16mm)	très long (<u>>16mm</u>)		
240 = 38	Séparation du pédicelle			1- très facile		<u>2- facile</u>		3- difficile				

PEPINS						
241 = 43	Formation des pépins	1- absente (type corinthien)		2- rudimentaire (type sultanien)		<u>3-complète</u>
242	Longueur pépins Valeur absolue (en mm) : <i>7</i>	très courts	courts	<u>moyens</u>	longs	très longs
243	Poids des pépins (moy. de 100 pépins secs) Valeur absolue (en cm) : -----	très faible (<10mg)	faible (25mg))	moyen (40mg)	élevé (55mg)	très élevé (>65mg)
244	Cannelures transversales face dorsale pépins	<u>1-absentes</u>		2-présentes		

INRA Vassal	Virus ENR ?	Mildiou	Esca	Chlorose
Codes OIV 2009 (= OCVV 2013)	Virus CN	Oïdium	Eutypiose	<u>Carence Mg</u>
Codes 000-internes	Autre	Botrytis	Excoseiose	Autre



Formulaire de description 6/8
(après chute des feuilles)

Année *2000*

Observateur

Code cépage

Code clone

Nom cépage *Alim brusse*

Emplacement : *7 R1351.355*

Sarment

2000

oiv 101 **section transversale** : circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 5.

oiv 102 **surface** : unie 1 - côtelée 2 - striée 3

oiv 103 **couleur générale** : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 **lenticelles** : absentes 1 - présentes 9.

oiv 105 **densité des poils dressés des noeuds** : absence 1 - présence 9.

oiv 106 **densité des poils dressés des entrenoeuds** : absence 1 - présence 9.

oiv 353 **longueur entrenoeuds** : très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 - longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

oiv 354 **diamètre entrenoeuds** : très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5 - grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Porte-greffe

oiv 551 **rendement en bois/ha** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 **formation de cal de soudure** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 **aptitude à la rhizogenèse** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal

Noeuds : aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3